

Skandinaviskt Smittskyddsreglemente

Gäller fr o m 1 april 2026



Smittskyddsreglemente för Skandinavisk Galopp

Detta reglemente gäller fr o m 1 april 2026.

Tillämpningsanvisningar till Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar
5 kap 15 §.

Med Skandinavisk Galopp och med respektive galopporganisation menas
Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Galopp.

Förkortningar:

- EHSLC: The European Horserace Scientific Liaison Committee

Webbplatser:

- svenskgalopp.se
- danskgalop.dk
- ovrevoll.no

Innehållsförteckning

Influensa	4
<i>Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och isoleringsrutiner.....</i>	<i>4</i>
Kvarka.....	5
<i>Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner</i>	<i>5</i>
MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus)	6
<i>Åtgärder vid misstanke/konstaterad MRSA</i>	<i>6</i>
<i>Häst/ar som har en MRSA-infektion</i>	<i>6</i>
<i>Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst</i>	<i>6</i>
<i>Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA</i>	<i>6</i>
<i>Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA</i>	<i>6</i>
Ringorm.....	7
<i>Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)</i>	<i>7</i>
<i>Behandling av hästar med symptom</i>	<i>7</i>
<i>Behandling av symptomfria hästar från smittat stall</i>	<i>7</i>
Övriga smittsamma sjukdomar.....	8

Influensa

Vaccinationsbestämmelserna följer EHSLC:s rekommendationer och gäller fr o m den 1 januari 2021. För att en häst ska få startanmälas eller få tränas på galoppbana eller få vistas i permanent stall eller gäststall på bana krävs att nedan angivna vaccinationer A och B har gjorts och att vaccinationsprogrammet fullföljs.

Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.

Vaccination B 21-60 dagar efter A.

Vaccination C 120-180 dagar efter B.

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall.

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras om. Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter revaccineras med 6 månaders intervall. Hästen måste ha blivit vaccinerad inom de senaste 6 månaderna för att få starta.

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits.

Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallet och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (via Skandinavisk Galopp) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Skandinavisk Galopp eller lokala smittskyddsveterinären.
- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas (måles) och antecknas (noteras). Anteckningarna ska kunna uppvisas om Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Isoleringen ska gälla 5 dygn (120 timmar) efter senast registrerad temperaturopp (alla hästar i stallet ska vara minst grundvaccinerade). För stall med hästar som enligt Skandinavisk Galopps regler är ofullständigt vaccinerade gäller en isoleringstid om 10 dygn (240 timmar). Den lokala smittskyddsgruppen eller smittskyddsveterinären ska godkänna att isoleringen hävs.
- Isolerad häst får inte startanmälas.
- Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående.

Kvarka

Under denna rubrik behandlas även sjukdomar som orsakar "kvarkaliknande" symptom utan att vara orsakad av "kvarkabakterien" Streptococcus Equi (dvs. isoleringstider etc. är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallen och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariaten) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Skandinavisk Galopps veterinäravdelning eller lokala smittskyddsveterinären.
- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas och antecknas. Anteckningarna ska kunna uppvisas om Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Stallet ska hållas isolerat intill dess att 20 dygn har förflutit från det att ingen häst längre visar symptom som näsflytning eller feber.
- Om sjuka hästar har förflyttats till isoleringsstall ska det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dygn under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknar, samma gäller stall dit eventuellt friska hästar flyttas.
- Isolerad häst får inte startanmälas.
- Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående.

MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus)

Åtgärder vid misstanke/konstaterad MRSA

Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hästen och kontakta lokala smittskyddsgruppen och/eller lokal smittskyddsveterinär, som övertar ansvaret för vidare åtgärder.

Häst/ar som har en MRSA-infektion

Häst med symptom i form av allmäninfektion eller lokal infektion i exempelvis sår, hudskada, led eller andra organ ska hållas kontaktisolerad (egen utrustning, skötsel, handsprit till skötare etc.) intill dess att 20 dygn har förflutit från det att hästen inte visar smittoförande symptom eller skador i huden. Sår som kan vara tveksamma, t.ex. karledsproblem och liknande, ska vara provtagna och befunna negativa innan hästen får startanmälas.

Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst

Dessa kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen har blivit kontaktisolerad från övriga hästar enligt ovan, annars gäller samma restriktion om 20 dygn som för den infekterade hästen.

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA

Om hästen inte har några kliniska symptom på infektion, har intakt hud och inte behandlas med antibiotika så omfattas den normalt inte av ovanstående restriktioner, då smittrisen anses som försumbar i tävlingssammanhang.

Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA

Omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.

- Isolerad häst får inte startanmälas
- Skandinavisk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär kan införa ytterligare restriktioner oavsett ovanstående

Ringorm

Under denna rubrik behandlas även andra smittsamma hudsjukdomar (dvs. behandlingar och isoleringstider är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hästen och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning eller lokala smittskyddsveterinären.

Behandling av hästar med symptom

Häst ska lokalbehandlas med adekvat läkemedel (eller annat antimykotikum) angivet/utskrivet av veterinär. Behandling minst 2 ggr/vecka i 2 veckor (dvs. minst fyra behandlingar). Om behandlingen varit verksam och ingen akutisering inträffat hävs isoleringen efter 20 dygn räknat från första behandlingsdag. Om häst som visar tecken på ringorm eller annan smittsam hudsjukdom avses delta i tävling ska ett veterinärintyg som visar att förändringarna inte är av smittsam art skickas till tävlingsorganisationen senast i samband med strykningstidens utgång.

Behandling av symptomfria hästar från smittat stall

Dessa ska behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat antimykotikum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan start/ankomst till tävlingsplats. Observera eventuell karenstid om hästen behandlats med läkemedel.

Övriga smittsamma sjukdomar

Regleras av Djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Kontakta lokal smittskyddsveterinär eller Skandinavisk Galopp för rådgivning när övriga smittsamma sjukdomar konstateras. Skandinavisk Galopp och/eller lokal smittskyddsveterinär äger rätt att utfärda restriktioner och anvisa åtgärder för dessa stall/anläggningar.

OBSERVERA: Ingen häst som, oavsett orsak, står under isolering får startanmälas.