

ANLÄGGNINGAR MED STORT FLÖDE AV HÄSTAR

En anläggning med ett stort flöde av hästar har högre smittrisk. Behandla hästar därifrån som potentiellt smittade. Gör följande handlingar/åtgärder för att minska smittrisken:

Ställ krav på hästhållaren; att en häst som kommer till anläggningen inte visat tecken på smittsam sjukdom, eller vistats på en anläggning där smittsam sjukdom förekommit under de senaste tre veckorna.

Kontrollera den nya hästens hälsotillstånd, vaccination och avmaskning.

Ta tempen dagligen på den nya hästen, under de första veckorna.

Använd, om möjligt, ett avskilt mottagningsstall och utevistelse för nya hästar och hästar som anlänt från djursjukhus under de första veckorna.

Tvätta händerna mellan hanteringen av olika hästgrupper.

Använd särskild uppställning för hästar som är på tillfälligt besök. Om möjligt, använd även avskild parkering för hästtransport, skötselyta samt fodring och vatten för de hästar som är på tillfälligt besök.

Undvik kontakt mellan hästarna som bor på anläggningen och hästar som är på besök.

Använd olika gruppställningar; håll unghästar, dräktiga ston, tävlande/resande hästar och träningshästar skilda från varandra, om möjligt.

jordbruksverket.se

#SMITTFRITTSTALL

LÄS MER: hastsverige.se | sva.se |